

BPC-157: el péptido que activa la reparación sin apagar defensas.

Nueva investigación de la Universidad de Zagreb documenta cómo BPC-157 modula la angiogénesis y el óxido nítrico con alta seguridad — LD1 no alcanzado en ningún ensayo.

■ LO QUE DESCUBRIÓ LA CIENCIA

BPC-157 activa la angiogénesis protectora y modula el óxido nítrico sin inhibir sus funciones esenciales de protección celular.

Concepto de citoprotección: de la mucosa gástrica a la organoprotección sistémica. Alta seguridad documentada en todos los modelos.

■ TRES DATOS QUE IMPORTAN

LD1

NO ALCANZADO

En todos los estudios publicados por el equipo de Sikiric, la dosis letal mínima (LD1) de BPC-157 no ha sido alcanzada. Perfil de seguridad documentado como excepcional.

VEGF

ANGIOGÉNESIS SELECTIVA

BPC-157 upregula VEGF (factor de crecimiento vascular) selectivamente. No promueve angiogénesis tumoral sino reparativa — diferencia crítica frente a las críticas sobre potencial oncogénico.

NO

MODULACIÓN DUAL DE NO

Modula óxido nítrico de forma dual: inhibe sus acciones citotóxicas y dañinas pero mantiene y recupera sus funciones protectoras. Mecanismo de "regulación inteligente".

■ ¿QUÉ SIGNIFICA PARA VOS?

Un péptido que repara sin comprometer defensas.

A diferencia de los antiinflamatorios convencionales (que suprimen tanto la inflamación dañina como la reparadora), BPC-157 distingue entre señales nocivas y protectoras. Activa lo que necesita y modera lo que daña.

La citoprotección: un principio que escala a todo el organismo.

El mismo mecanismo que protege la mucosa gástrica se aplica al riñón, el hígado, el corazón, los tendones y el sistema nervioso. Este concepto de organoprotección es la base científica de los protocolos CELLISSE.